

四庫全書

經部

欽定四庫全書

子部

儒門事親卷七至九

詳校官太醫院吏目_臣宋桂

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允_臣王燕緒

校對官中書_臣呂雲棟

謄錄監生_臣洪棗

欽定四庫全書

儒門事親卷七

金 張從正 撰

燥形

臂麻不便八十九

郾城梁賈人年六十餘忽曉起梳髮覺左手指麻斯須
半臂麻又一臂麻斯須頭一半麻比及梳畢從脇至足
皆麻大便二三日不通往問他醫皆云風也或藥或鍼

皆不解求治于戴人戴人曰左手三部脉皆伏比右手小三倍此枯澁痺也不可純歸之風亦有火燥相兼乃命一涌一泄一汗其麻立已後以辛涼之劑調之潤燥之劑濡之惟小指次指尚麻戴人曰病根已去此餘烈也方可鍼谿谷谿谷者骨空也一日晴和往鍼之用靈樞中雞足法向上卧鍼三進三引訖復卓鍼起向下卧鍼送入指間皆然手熱如火其麻全去昔劉河間作原病式常以麻與澁同歸燥門中真知病機者也

大便燥結九十

戴人過曹南省親有姨表兄病大便燥澀無他證常不敢飽食飽則大便極難結實如鐵石或三五日一如圍目前星飛鼻中血出肛門連廣腸痛極則發昏服藥則病轉劇烈芑苳芫花甘遂之類皆用之過多則困瀉止則復燥如此數年遂畏藥性暴急不服但卧病待盡戴人過診其兩手脉息俱滑實有力以大承氣湯下之繼服神功丸麻仁丸等藥使食菠菱葵菜及猪羊血作

羹百餘日克肥親知見駭之嗚呼粗工不知燥分四種
燥於外則皮膚皺揭燥於中則精血枯涸燥於上則咽
鼻焦乾燥於下則便溺結閉夫燥之為病是陽明化也
水液寒少故如此然可下之當擇藥投之芑豈可以下
寒甘遂芫花可下濕大黃朴硝可以下燥內經曰辛以
潤之鹹以栗之周禮曰以滑養竅

孕婦便結九十一

戴人過東杞一婦人病大便秘結小便淋澁半生不娠

惟常服疎導之藥則大便通利暫廢藥則結滯忽得孕至四五月間醫者禁疎導之藥大便依常為難臨圓則力努為之胎墜凡如此胎墜者三又孕已經三四月望前後洩溺結澁甘分胎墮乃訪戴人戴人診其兩手脉俱滑大脉雖滑大以其且妊不敢陡攻遂以食療之用花減煮菠菱葵菜以車前子苗作茹雜猪羊血作羹食之半載居然生子其婦燥病方愈戴人曰余屢見孕婦利膿血下迫極努損胎但同前法治之愈者莫知其

數也為醫拘常禁不能變通非醫也非學也識醫者鮮是難說也

偏頭痛九十二

一婦人年四十餘病額角上耳上痛嗚呼為偏頭痛如此五七年每痛大便燥結如彈丸兩目赤色眩運昏澁不能遠視世之所謂頭風藥餅子風藥白龍丸芎犀丸之類連進數服其痛雖稍愈則大便稍秘兩目轉昏澁其頭上鍼灸數十百矣連年著灸其兩目且將失明由

病而無子一日問戴人戴人診其兩手脉急數而有力
風熱之甚也余諳此四五十年矣遍察病目者不問男
子婦人患偏正頭痛必大便澁滯結硬此無他頭痛或
額角是三焦相火之經及陽明燥金勝也燥金勝乘肝
則肝氣鬱肝氣鬱則氣血壅氣血壅則上下不通故燥
結於裏尋至失明治以大承氣湯令河水煎三兩加芒
硝一兩煎殘頓令溫分作三五服連服盡蕩滌滌腸中垢
滯結燥積熱下泄如湯二十餘行次服七宣九神功丸

以潤之菠菱葵菜猪羊血為羹以滑之後五七日十日
但遇天道晴明以大承氣湯夜盡一劑是痛隨利減也
三劑之外目豁首輕燥澤結釋得三子而終

腰胯痛九十三

一男子六十餘病腰尻脊胯皆病數載不愈晝靜夜躁
大痛往來屢求自盡天年且夕則痛作必令人以手槌擊
至五更雞鳴則漸減向曙則痛止左右及病者皆作鬼
神陰譴白虎齧朝禱暮祝現巫僧道禁師至則其痛以

減又夢鬼神戰鬪相擊山川神廟無不祭者淹延歲月
肉瘦皮枯飲食減少暴怒日增惟候一死有書生曰既
云鬼神虎齧陰譴之禍如此禱祈何無一應聞陳郡有
張戴人精於醫可以問其鬼神白虎與病乎彼若術窮
可以委命其家從之戴人診其兩手脉皆沉滯堅勁力
如張絙謂之曰病雖瘦難於食然腰尻脊胯皆痛者必
大便堅燥其左右曰有五七日或八九日見燥糞一兩
塊如彈丸結硬不可言曾令人剗取之僵下一兩塊渾

身燥痒皮膚皴揭枯澁如麩片戴人既得病之虛實隨用大承氣湯以姜棗煎之加牽牛頭末二錢不敢言是瀉劑蓋病者聞煖則悅聞寒則懼說補則從說瀉則逆此弊非一日也而况一齊人而傅之衆楚人咻之乎及煎成使稍熱嚙之從少至多累至三日天且晚臍腑下泄四五行約半盆以燈視之皆燥糞燥痺塊及瘀血雜臟穢不可近須臾痛減九分昏睡鼻息調如常人睡至明日將夕始覺飢而索粥溫涼與之又困睡一二日其

痛盡去次令飲食調養日服導飲丸甘露散滑利便溺之藥四十餘日乃復嗚呼世傳三十六虎書三十六黃經及小兒三十六吊誰為之耶始作俑者其無後乎古人以醫為師故醫之道行今之人以醫辟奴故醫之道廢有志之士恥而不學病者亦不擇精粗一槩待之常見官醫迎送長吏馬前唱喏真可羞也由是通今博古者少而師傅遂絕靈樞經謂刺與汗雖久猶可拔而雪結與閉雖久猶可解而決去腰脊膀痛者足太陽膀胱

經也。胯痛足少陽膽經之所過也。難經曰：諸痛為實，內經曰：諸痛痒瘡瘍皆屬心火。注曰：心寂則痛微，心燥則痛甚。人見巫覡僧道禁師至，則病稍去者，心寂也。然去其後來者，終不去其本也。古之稱痛隨利減，不利則痛何由去病者，既痊乃壽八十歲。故凡燥證皆三陽病也。

寒形

因寒腰強不能屈伸九十四

北人衛德新因之析津冬月飲寒則冷病腰常直不能

屈伸兩足沉重難於行步途中以床舁遞程程問醫皆云腎虛以菴苓芑戟附子鹿茸皆用之大便反秘潮熱上周將經歲矣乃乞拯於戴人戴人曰此疾十日之效耳衛曰一月亦非遲戴人曰足太陽經血多病則腰似折脰如結膈如裂太陽所至為屈伸不利况腰者腎之府也身中之大關節今既強直而不利宜鹹以熯之頓服則和柔矣難經曰強力入房則腎傷而髓枯枯則高骨乃壞而不用與此用同今君之證太陽為寒所遏血

墜下滯腰間也太陽膀胱經必有積血非腎也節次以藥可下數百行約去血一二斗以九曲玲瓏竈蒸之汗出三五次而愈初蒸時至五日問曰腹中鳴否德新曰未也至六日覺鳴七日而起以能揖人戴人曰病有熱者勿蒸蒸則損人目也

寒疝亦名水疝九十五

律科王敏之病寒疝臍下結聚如黃芩每發遠腰急痛不能忍戴人以舟車丸猪腎散下四五行覺藥繞病三

五次而下其瀉皆水也猪腎甘遂皆苦寒經言以寒治寒方舉萬全但下後忌飲冷水及寒物宜食乾物以寒疝本是水故也即日病減八分食進一倍又數日以舟車九百餘粒通經散四五錢服之利下候三四日又服舟車九七八十粒猪腎散三錢乃健步如常矣

一僧病疝發作冷氣上貫齒下貫腎緊若繩挽兩鞞時腫而冷戴人診兩手脉細而弱斷之曰秋脉也此因金氣在上下伐肝木木畏金抑而不伸故病如是肝氣壅

礪不能下榮於畢九故其寒實非寒也木受金制傳之
胃土胃為陽明故上貫齒病非齒之病肝木者心火之
母也母既不伸子亦屈伏故下冷而水化乘之經曰木
鬱則達之土鬱則泄之令涌泄四次果覺氣和畢九痒
而暖戴人曰氣已入畢中矣以茴香木茂之藥使常服
之首尾一月而愈

感風寒九十六

戴人之常谿也雪中冒寒入浴重感風寒遂病不起但

使煎通聖散單服之一二日不食惟渴飲水亦不多飲
時時使人搥其股按其腹凡三四日不食日飲水一二
十度至六日有謔語妄見以調胃承氣湯下之汗出而
愈戴人常謂人曰傷寒勿妄用藥惟飲水最為妙藥但
不可使之傷常令揉散乃大佳耳至六七日見有下證
方可下之豈有變異哉奈何醫者禁人飲水至有渴死
者病人若不渴強與水飲亦不肯飲耳戴人初病時鼻
塞聲重頭痛小便如灰淋汁及服調胃承氣一兩半覺

欲嘔狀探而出之汗出皦皦然須臾下五六行大汗一日乃瘳當日飲冰水時水下則痰出約一二椀痰即是病也痰去則病去也戴人時年六十一

凍瘡九十七

戴人女僮足有寒瘍俗云凍瘡戴人令服舟車丸瀆川散大下之其瘡遂愈人或疑之戴人曰心火降則寒消何疑之有

寒痰九十八

一婦人心下臍上結硬如斗按之如石人皆作病胎鍼灸毒藥禱祈無數如捕風然一日戴人見之曰此寒痰診其兩手寸脉皆沉非寒痰而何以茺蒂散吐之連吐六七升其塊立消過半俟數日後再吐之其涎沫類雞黃腥臭特殊約二三升凡如此者三後以人參調中湯五苓散調之腹已平矣

瀉利惡寒九十九

東門一男子病瀉痢不止腹鳴如雷不敢冷坐坐則下

注如傾諸醫例斷為寒証乾姜官桂丁香豈菴之屬枯
礬龍骨皆服之矣何鍼不燔何艾不炷遷延將二十載
矣一日問于戴人戴人曰兩手寸脉皆滑余不以為寒
然其所以寒者水也以茶調散涌寒水五七升無憂散
泄積水數十行乃通因通用之法也次以五苓散淡劑
滲泄利之道又以甘露散止渴不數日而冷食寒飲皆
如故此法王啓玄稔言之矣奈無人用之哉

內傷形

因憂結塊一百

息城司候聞父死于賊乃大悲哭之罷便覺心痛日增
不已月餘成塊狀若覆杯大痛不住藥皆無功議用燔
鍼炷艾病人惡之乃求于戴人戴人至適巫者在其傍
乃學巫者雜以狂言以謔病者至是大笑不忍回面向
壁一二日心下結塊皆散戴人曰內經言憂則氣結喜
則百脉舒和又云喜勝悲內經自有此法治之不知何
用鍼灸哉適足增其痛耳

病怒不食一百一

項關令之妻病食不欲食常好叫呼怒罵欲殺左右惡言不輟衆醫皆處藥幾半載尚爾其夫命戴人視之戴人曰此難以藥治乃使二娼各塗丹粉作伶人狀其婦大笑次日又令作角觝又大笑其旁常以兩箇能食之婦誇其食美其婦亦索其食而為一嘗之不數日怒減食增不藥而瘥後得一子夫醫貴有才若無才何足應變無窮

不寐一百二

一富家婦人傷思慮過甚二年不寐無藥可療其夫求
戴人治之戴人曰兩手脉俱緩此脾受之也脾主思故
也乃與其夫以怒而激之多取其財飲酒數日不處一
法而去其人大怒汗出是夜困眠如此者八九日不寤
自是而食進脉得其平

驚一百三

衛德新之妻旅中宿于樓上夜值盜劫人燒舍驚墮牀

下自後每聞有響則驚倒不知人家人輩躡足而行莫敢冒觸有聲歲餘不痊諸醫作心病治之人參珍珠及定志丸皆無効戴人見而斷之曰驚者為陽從外入也恐者為陰從內出驚者為自不知故也恐者自知也足少陽膽經屬肝木膽者敢也驚怕則膽傷矣乃命二侍女執其兩手按高椅之上當面前下置一小几戴人曰娘子當視此一木猛擊之其婦大驚戴人曰我以木擊几何必驚乎伺少定擊之驚也緩又斯須連擊三五次

又以杖擊門又暗遣人畫背後之窻徐徐驚定而笑曰
是何治法戴人曰內經云驚者平之平者常也平常見
之必無驚是夜使人擊其門窻自夕達曙夫驚者神上
越也從下擊几使之下視所以收神也一二日雖聞雷
亦不驚德新素不喜戴人至是終身厭服如有人言戴
人不知醫者執戈以逐之

兒寐不寤一百四

陳州長吏一小兒病寐而不寤一日諸醫作睡驚治之

或欲以艾火灸之或以大驚丸及水銀餅子治之其父曰此子平日無疾何驟有驚乎以子之病乃問于戴人戴人診其兩手脉皆平和戴人曰若驚風之脉當洪大而強今則平和非驚風也戴人竊問其乳母爾三日前曾飲醉酒否遽然笑曰夫人以煮酒見餉酒味甚美三飲一罌而睡陳酒味甘而戀隔酒氣滿乳兒亦醉也乃剉甘草乾葛花硝砂仁貫衆煎汁使飲之立醒

孕婦下血一百五

劉先生妻有娠半年因傷損下血乞藥于戴人戴人診之以三和湯一名玉燭散承氣湯四物湯對停加朴硝煎之下數行痛如手拈下血亦止此法可與智識高明者言膏粱之家慎勿舉似非徒駭之抑又謗之嗚呼正道難行正法難用古今皆然

收產傷胎一百六

一孕婦年二十餘臨產召穩媪三人其二媪極拽婦之臂其一媪頭抵婦之腹更以兩手扳其腰極力為之胎

死于腹良久乃下兒亦如血乃穩媪殺之也豈知菘熟
自落何必如此乎其婦因茲經脉斷閉腹如刀刺大渴
不止小溲闕絕主病者禁水不與飲口舌枯燥牙齒齩
黑臭不可聞食飲不下昏憤欲死戴人先以冰雪水恣
意飲之約二升許痛緩渴止次以舟車丸通經散前後
五六服下數十行食大進仍以桂苓甘露散六一散柴
胡飲子等調之半月獲安

又一婦人臨產召村媪數人侍焉先產一臂出媪不測

輕重拽之臂為之斷子死于腹其母面青身冷汗熱熱
不絕時微喘嗚乎病家甘于死忽有人曰張戴人有奇
見試問之戴人曰命在須臾鍼藥無及急取秤鈎續以
壯繩以膏塗其鈎令其母分兩足向外偃坐左右各一
人脚上立足次以鈎其死胎命一壯力婦倒身拽出死
胎下敗血五七升其母昏困不省待少頃以冰水灌之
漸嚙二日大醒食進次日四物湯調血數日方愈戴人
常曰產後無他事因侍嫗非其人轉為害耳

懷恐脇痛一百七

洛陽孫伯英因誣獄妻子被繫逃于故人是夜覺胃脇痛託故人求藥故人曰有名醫張戴人適在焉當與公同往時戴人宿酒未醒強呼之故人曰吾有一親人病欲求診戴人隔牕望見伯英曰此公伏大驚恐故人曰何以知之戴人曰面青脫色膽受怖也後會赦乃出方告戴人

背疽一百八

一富家女子十餘歲好食紫櫻每食即二三斤歲歲如此至十餘年一日潮熱如勞戴人診其兩手脉皆洪大而有力謂之曰他日必作惡瘡腫毒熱上攻目陽盛陰脫之證其家大怒不肯服解毒之藥不一二年患一背疽如盤痛不可忍其女忽思戴人曾有是言再三悔過請戴人戴人以銚鍼繞疽暈刺數百鍼去血一斗如此三次漸漸痛減腫消微出膿而斂將作痂時使服十補內托散乃痊終身忌口然目亦昏終身無子

肺癰一百九

舞水一富家有二子長者年十三歲幼者十一歲皆好
頓食紫櫻一二斤每歲須食半月後一二年幼者發肺
癰長者發肺痿相繼而死戴人常嘆曰人之死者命耶
天耶古人有詩葬口物多終作疾真格言也天生百菓
所以養人非欲害人然富貴之家失教縱欲遂至於
是

咽中刺塞一百十

戴人過瀘陽強家一小兒約五六歲同隊小兒以蜀黍

楷相擊逆芒倒刺於咽中數日不下粥藥腫大發其家
告戴人戴人命取水依道經中咒水法以左手屈中指
及無名指作三山印坐水盞于其上右手掐印文是金
鎗印脚踏丁字立望太陽或燈火取氣一口吹在淨水
盞中咒曰吾取老君東流順老君奉勅攝去毒水吾托
大帝尊所到稱吾者各各現帝身急急如律令攝念七
遍吹在盞中虛攪卓三次為定其兒嚙水下咽曰我可
也三五日腫散乃知法亦有不可侮者

誤吞物咽中一百十一

一小兒誤吞一錢在咽中不下諸醫皆不能取亦不能下乃命戴人戴人熟思之忽得一策以淨白表紙令卷實如箸以刀縱橫亂割其端作鬚髻之狀又別取一箸縛鍼鈎於其端令不可脫先下咽中輕提輕抑一探之覺鈎入於錢竅然後以紙卷納之咽中與鈎尖相抵覺鈎尖入紙卷之端不礙肌肉提之而出

腸癖下血一百十二

棠谿藥彥剛病下血醫者以藥下之默默而死其子企
見戴人而問之曰吾父之死竟無人知是何證戴人曰
病剉其心也心主行血故被剉則血不禁若血溫身熱
者死火數七死必七日治不當下若下之不滿數企曰
四日死何謂痛剉心戴人曰智不足而強謀力不足而
強與心安得不剉也藥初與邪爭屋不勝遂得此病企
由是大服拜而學醫

水腫畢九一百十三

霍秀才之子年十二歲畢丸一旁腫臍戴人見之曰此因驚恐得之驚之為病上行則為嘔血下則腎傷而為水腫以琥珀通經散一瀉而消散

伏驚一百十四

上渠卜家一男子年二十八歲病身弱四肢無力面色蒼黃左脇下身側上下如臂狀每發則痛無時食不減大便如常小便微黃已二三載矣諸醫計窮求戴人治之視其部分乃足厥陰肝經兼足少陽膽經也張曰甲

膽乙肝故青其黃者脾也診膽脉小此因驚也驚則膽受邪腹中當有驚涎綠水病人曰昔曾屯軍被火自是而疾戴人夜以舟車百五十九澹川散四五錢加生薑自然汁平旦果下綠水五行或問大加生薑何也答曰辛能伐木也下後覺微痛令再下之比前藥減三一又下綠水三四行痛止思食反有力戴人謂卜曰汝妻亦當病卜曰太醫未見吾妻何以知之曰爾感此驚幾年矣卜省曰當被火時我正在草堂中熟寐人驚喚

我睡中驚不能言火已塞門我父拽出我火中今五年矣張曰汝膽伏火驚甲木乘脾土是少陽相火乘脾脾中有熱故能食而殺穀熱雖能化穀其精氣不完汝必無子蓋敗經反損婦人汝妻必手足熱四肢無力經血不時卜曰吾妻實如此亦已五年矣他日門人因觀內經言先瀉所不勝次瀉所勝之論其法何如以問張張曰且如膽木乘胃土此土不勝木也不勝之氣尋救于子已土能生庚金庚為大腸味辛者為金故大加生薑

使伐木然先不開脾土無由行也遂用舟車丸先通其
閉塞之路是先瀉其所不勝後用薑汁調瀆川散大下
之次瀉其所勝也大抵陽干剋陽干腑剋腑臟剋臟

外傷形

孕作病治一百十五

一婦人年四十餘得孕自以為年衰多病故疾復作以
告醫氏醫者不察加燔鍼於臍兩旁又以毒藥致磨轉
轉腹痛食減形羸已在牀枕來問戴人戴人診其脉曰

六脉皆平惟右尺洪大有力此孕脉也兼擇食為孕無疑左右皆笑之不數月生一女子兩目下各有燭鍼痕幾喪其明凡治病婦當先問娠不可倉卒矣

杖瘡一百十六

戴人出遊道經故息城見一男子被杖瘡痛焮發毒氣入裏驚涎堵塞牙禁不開粥藥不下前後月餘百治無功甘分於死戴人先以三聖散吐青蒼驚涎約半大疋次以利膈丸百餘粒下臭惡燥糞又一大疋復煎通聖

散數錢熱服之更以酸辣葱醋湯發其汗斯須汗吐交出其人活矣此法可以救寃

落馬發狂一百十七

一男子落馬發狂起則目瞪狂言不識親疎棄衣而走罵言涌出氣力加倍三五人不能執縛燒符作醮問鬼跳巫殊不之顧丹砂牛黃犀珠腦麝資財散去室中蕭然不遠二百里而求戴人一往戴人以車輪埋之地中約高二丈許上安之中等車輪其輞上鑿一穴如作盆

之狀縛狂病人於其上使之伏卧以軟裯襯之又令一人於下坐機一枚以捧攪之轉千百遭病人吐出青黃涎沫一二斗許繞車輪數匝其病人曰我不能任可解我下從其言而解之索凉水與之冰水飲數升狂方罷矣

犬傷脛腫一百十八

麻先生兄村行為犬所齧昇至家脛腫如罐堅若鐵石毒氣入裏嘔不下食頭痛而重往問戴人女僮曰痛隨

利減以檳榔丸下之見兩行不瘥適戴人自舞陽回謂
麻曰脛腫如此足之二陰三陽可行乎麻曰俱不可行
如是何不大下之乃命夜臨卧服舟車丸百五十粒通
經散三四錢比至夜半去十四行腫立消作胡桃紋反
細於不傷之脛戴人曰慎勿貼膏紙當令毒氣出流膿
血水常行又一日戴人恐毒氣未盡又服舟車丸百餘
粒濬川散三四錢見六行病人曰十四行易當六行反
難何也戴人曰病盛則勝藥病衰則不勝其藥也六日

其膿水盡戴人曰膿水行時不畏風盡後畏風也乃以愈風餅子日三服之又二日方與生肌散一傅之而成痂嗚呼用藥有多寡使差別相懸向使不見戴人則利減之言非也以此知知醫已難用醫尤難

足閃朒痛一百十九

谷陽鎮酒監張仲溫謁一廟觀匠者砌露臺高四尺許因登之下臺或朒一足外踝腫起熱痛如火一醫欲以銚鍼刺腫出血戴人急止之曰朒已痛矣更加鍼二痛

俱作何以忍也乃與神祐丸八九十九下二十餘行禁
食熱物夜半腫處發痒痛止行步如常戴人曰吾之此
法十治十愈不誑後人

膝朒跛行一百二十

葛塚馮家一小兒七八歲膝被朒跛行行則痛數日矣
聞戴人善醫令人問之戴人曰小病耳教來是夜以舟
車丸通經散溫酒調而下之夜半涌泄齊行上吐一椀
下泄半缶既上床其小兒謂母曰膝朒痒不可往來曰

使服烏金丸壯其筋骨一月疾愈而走矣

杖瘡入水一百二十二

小渠袁三因強盜入家傷其兩腋外臚作瘡數年不已
膿汁常涓涓然但飲冷則瘡間冷水浸淫而出延為濕
瘡來求治于戴人曰爾中焦當有綠水二三升涎數掬
袁曰何也戴人曰當被盜時感驚氣入腹驚則膽傷足
少陽經也兼兩外臚皆少陽之部此膽之甲木受邪甲
木色青當有綠水少陽在中焦如溫既伏驚涎在中焦

飲冷水咽為驚涎所阻水隨經而旁入瘡中故飲水則
瘡中水出乃上涌寒痰汗如流水次下綠水果二三升
一夕而痂乾真可怪也

儒門事親卷七

欽定四庫全書

儒門事親卷八

金 張從正 撰

內積形

傷冷酒一百二十二

戴人出遊道經陽夏問一舊友其人病已危矣戴人往視之其人曰我別無病三年前當隆暑時出村野有以煮酒饋予者適村落無湯器冷飲數升便覺左脇下悶

漸痛結硬至今不散鍼灸磨藥殊不得効戴人診其兩
手脈俱沉實而有力先以獨聖散吐之一涌二三升色
如煮酒香氣不變後服和脾散去濕藥五七日百脉冲
和始知鍼灸無功增苦楚矣

心下沉積一百二十三

顯慶寺僧應公有沉積數年雖不卧床枕每於四更後
心頭悶硬不能安卧須起行寺中習以為常人莫知為
何病以藥請于戴人戴人令涌出膠涎一二升如黑礬

水繼出黃綠水又下膿血數升自爾胸中如失巨山飲
餌無算安眠至曉

茶癖一百二十四

一緇侶好茶成癖積在左脇戴人曰此與肥氣頗同然
瘡瘡不作便非肥氣雖病十年不勞一日况兩手脈沉
細有積故然吾治無鍼灸之苦但小惱一餉可享壽盡
期先以茶調散吐出宿茶水數升再以木如意搯之又
涌數升皆作茶色次以三花神祐丸九十餘粒是夜瀉

二十餘行膿水相兼燥糞瘀血雜然而下明日以除濕之劑使服十餘日諸苦悉蠲神清色瑩

腹脹水氣一百二十五

盛躡張承應年幾五十腹如孕婦面黃食減欲作水氣或令服黃芪建中湯及溫補之劑小溲涸閉從戴人療焉戴人曰建中湯攻表之藥也古方用之攻裏已誤也今更以此取積兩重誤也先以涌劑吐之置火於其旁大汗之次與猪腎散四錢以舟車丸引之下六疋殊不

困續下兩次約三十餘行腹平軟健啖如昔常仲明云
向聞人言瀉五六疋人豈能任及聞張承應渠云誠然
乃知養生與攻病本自不同今人以補劑療病宜乎不
効

瘥氣一百二十六

王亭村一童子入門狀如鞠恭而行戴人曰瘥氣也令
解衣揣之二道如臂其家求療于戴人先刺其左如刺
重紙剝然有聲而斷令按磨之立軟其右亦然觀者咸

嗟異之或問曰石關穴也

胸膈不利一百二十七

沈丘王宰妻病胸膈不利口流涎沫自言咽下胃中常雷聲心間作微痛又復發昏胸乳之間灸癥如碁化痰利膈等藥服之三載病亦依然其家知戴人痰藥不損來求之一涌而出雪白虫一條長五六寸有口鼻牙齒走於涎中病者忿而斷之中有白髮一莖此正與徐文伯所吐宮人髮癥一同虫出立安

冷積一百二十八

戴人過醮都營中飲會隣席有一卒說出妻事戴人問其故答曰吾婦為室女心下有冷積如覆盂按之如水聲以熱手熨之如水聚來已十五年矣恐斷我嗣是故棄之戴人曰公勿黜也如用吾藥病可除孕可得卒從之戴人診其脉沉而遲尺脉洪大而有力非無子之候也可不踰年而孕其良人笑曰試之先以三聖散吐涎一斗心下平軟次服白朮調中湯五苓散後以四物湯

和之不再月氣血合度數月而娠二子戴人常曰用吾此法無不子之婦此言不誣

積塊一百二十九

菓菌劉子平妻腹中有塊如瓢十八年矣經水斷絕諸法無措戴人令一月之內涌四次下六次所去痰約一二桶其中不化之物有如葵菜者爛魚腸之狀涌時以木如意搯之覺病積如刮漸漸而平及積之既盡塊痕反窪如舊畧無少損至是而面有童色經水復行若當

年少可以有子

肥氣積一百三十

陽夏張主簿之妻病肥氣初如酒杯大發寒熱十五餘
年後因性急悲感病益甚惟心下三指許無病滿腹如
石片不能坐卧鍼灸匝矣徒勞人耳乃敬邀戴人而問
之既至斷之曰此肥氣也得之季夏戊己日在左脇下
如覆杯久不愈令人發瘡瘡瘡者寒熱也以芥蒂散
吐之魚腥黃涎約一二缶至夜繼用舟車丸通經散投

之五更黃涎膿水相半五六行凡有積處皆覺痛後用
白朮散當歸散和血流經之藥如斯涌泄凡三四次而
方愈

伏瘕一百三十一

汴梁曹大使女年既笄病血瘕數年太醫宜企賢以破
血等藥治之不愈企賢曰除得陳州張戴人方愈一日
戴承語至汴京曹大使乃邀戴人問焉戴人曰小腸遺
熱於大腸為伏瘕故結硬如塊面黃不月乃用涌泄之

法數年之疾不再旬而効女由是得聘企賢問誰治之
曹大使曰張戴人企賢立使人邀之

停飲一百三十二

一婦從年少時因大哭罷痛飲冰水困卧水停心下漸
發痛悶醫氏咸以為冷積治之以溫熱劑及禁食冷物
一聞茶氣病輒內作如此數年燎鍼燒艾瘡孔數千十
餘年後小便赤黃大便秘悶兩目加昏積水轉甚流於
兩脇世謂水癖或謂支飲硃漆稜茂攻磨之藥竟施之

矣食日衰積日茂上至鳩尾旁至兩脇及臍下但發之時按之如水聲心腹結硬手不可近者月發五七次甚則欲死諸藥皆厭二十餘年求戴人發藥診其脉寸口獨沉而遲此胸中有痰先以葶蒂散涌痰五七升不數日再越痰水及斗又數日上涌數升凡三涌三下汗如水者亦三其積皆去以流濕飲之藥調之月餘大瘥

積氣一百三十三

寄西華縣庠山東顏先生有積二十年目視物不真細

字不覩當心如頑石每發痛不可忍食減肉消黑黥滿
面腰不能直因遇戴人令涌寒痰一大盞如片粉夜以
舟車丸通經散下爛魚腸葵菜汁七八行病十去三四
以熟漿粥投之復去痰一盆次日又以舟車丸通經散
前後約百餘行略無少困不五六日面紅黥去食進目
明心中空曠遂失頑石所在旬日外來謝

沉積疑胎一百三十四

脩弓杜匠其子婦年三十有孕已歲半矣每發痛則召

侍媪待之以為將產也一二日復故凡數次乃問戴人
戴人診其脉濇而小斷之曰塊病也非孕也脉訣所謂
濇脉如刀刮竹形主丈夫傷精女人敗血治之法下有
病當瀉之先以舟車丸百餘粒後以調胃承氣湯加當
歸桃仁用河水煎乘熱投之三兩日又以舟車丸桃仁
承氣湯瀉青黃膿血雜然而下每更衣以手向下推之
揉之則出後三二日又用舟車丸以猪腎散佐之一二
日又以舟車丸通經如前數服病十去九俟晴明當未

食時以鍼瀉三陰交穴不再旬塊已沒矣此與隔腹視五臟者復何異哉

是胎非積一百三十五

鬚王之妻病臍下積塊嘔食面黃肌瘦而不月或謂之乾血氣治之無効戴人見之曰孕也其人不信再三求治于戴人與之平藥以應其意終不肯下毒藥後月到果胎也人問何以別之戴人曰尺脉洪大也素問陰陽別論所謂陰搏陽別之脉

外積形

瘤一百三十六

戴人在西華衆人皆訕以為吐瀉一日魏壽之與戴人入食肆中見一夫病一瘤正當目之上網內皆色如灰李下垂覆目之睛不能視物戴人謂壽之曰吾不待食熟立取此瘤魏未之信也戴人曰吾與爾取此瘤何如其人曰人皆不敢割戴人曰吾非用刀割別有一術焉其人從之乃引入一小室中令俛卧一床以繩束其脰

刺乳中大出血先令以手揉其目瘤上亦刺出雀糞立
平出戶壽之大驚戴人曰人之有技可盡窺乎

膠瘤一百三十七

郟城戴人之鄉也一女子未嫁年十八兩手背皆有瘤
一類雞距一類角丸腕不能釗向明望之如桃膠然夫
家欲棄之戴人見之曰在手背為膠瘤在面者為粉瘤
此膠瘤也以銚鍼十字刺破按出黃膠膿三兩匙立平
瘤核更不再作婚事復成非素明者不敢用此法矣

癭一百三十八

新寨婦人年四十餘有癭三瓣戴人令以鹹吐之三涌
三汗三下癭已半消次服化癭之藥遂大消去夫病在
上者皆宜吐亦自有消息之法耳

痔一百三十九

趙君玉常病痔鳳眼草刺蝟皮槐根狸首之類皆用之
或以乾薑作末塗猪肉炙食之大便燥結不利且痛後
數日因病黃大涌瀉數次不言痔作麻先生偶記而書

之君玉自識戴人之後痔更不發耳

儒門事親卷八

欽定四庫全書

儒門事親卷九

金 張從正 撰

雜記九門

誤中涌法 嗽

張板村鹿子春一小兒七八歲夏月病嗽羸甚戴人欲
涌之子春以為兒幼弱懼其不勝少難之一日因飲酒
家人與之酒傷多乃大吐吐定而嗽止蓋酒味苦苦屬

通劑子春乃大悟戴人之言也

疥

貨生藥焦百善云有蕘夫來買苦參欲治疥不識藥性
緩急但聞人言可治濃煎一椀服之須臾大吐涎一盆
三二日疥作痂矣

赤目

一小兒名德孫眼發赤其母買銅碌欲洗兒目煎成家
人誤與兒飲之須臾大吐吐訖立開

感風寒

焦百善偶感風寒壯熱頭痛其巷人點蜜茶一椀使吸之焦因熱服之訖偶思戴人語曰凡苦味皆能涌百善兼頭痛是病在上試以筋探之畢其痛立解

誤中寒涼

經閉

一婦人年二十餘歲病經閉不行寒熱往來欬嗽潮熱庸醫禁切無物可食一日當暑出門忽見賣涼粉者以冰水和飲大為一食頓覺神清骨健數月經水自下

下血

一男子臟毒下血當六月間熱不可堪自甘於死忽思
冰蜜水猛捨性命飲一大盃痛止血住

痢

一男子病膿血惡痢痛不可忍忽見水浸甜苳心酷喜
之連皮食數枚膿血皆已人言下痢無正形是何言也
人止知痢是虛冷溫之燥之澁之截之此外無術矣豈
知風暑火濕燥寒六者皆為痢此冰蜜甜苳所以効也

臨變不惑 涌法

戴人在西華夏公宅其僕鄭驢病法當吐命女僮下藥藥失不製又用之太多涌之不出反悶亂不醒乃告戴人戴人令以薪實馬槽既平昇鄭驢卧其上倒垂其頭須臾大吐吐訖而快戴人曰先宜少進不涌旋加

西華一老夫病法當吐令門人藥景先下藥景先初學其人不吐反下走二行乃告戴人戴人令取溫薑汁飲二椀再下涌藥一錢以雞翎探之乃吐既藥行方大吐

吐訖又安戴人曰凡用吐藥先以薑汁一椀橫截之藥既咽下待少頃其雞翎勿令離口酸苦鹹雖能吐人然不撩何由出也

李仲安宅四婦人病同日下涌劑置煨室中火兩盆其一婦發昏衆人皆驚戴人笑曰內火見外火故然昇之門外使飲冰雪水立醒時正雪晴戴人曰熱見寒則醒衆由是皆服非老手諳練必不能鎮衆人之驚也

涌嗽

楊壽之妻病嗽十餘年法當吐之一日不止以麝香湯止之夜半猶不定再止之明旦頗覺惡心更以人參湯止之二日稍寧自下藥凡三來問戴人不顧謂藥景先曰病久嗽藥已擒病自然遲解涌後調理數日乃止戴人常言涌後有頓快者有徐快者有反悶悶者病未盡也有反熱者不可不下也大抵三日後無不快者凡下不止者以冰水解之凡藥熱則行寒則止

當禁不禁 病愈後犯禁而死

孟大亨病腫既平當節食及鹽血房室等不慎病再適戴人歸家無救之者乃死

郟城董德固病勞嗽戴人曰愈後當戒房事其病愈恃其安觸禁而死後妻生一子正當病瘥之日也董初堅諱至是乃彰

一宦家小兒病痢自堰頭車載至朱葛寺入門而死戴人曰有病遠行不可車載馬馱病已擾矣又以車馬動

搖之是為重擾宜其即死

陽夏韓氏為犬所啗大痛不可忍偏痺燥自庄頭載至家二十里一夕而死時人皆不知車之誤也戴人常言傷寒之後忌葷肉房事勞水腫之後禁房及油鹽滋味等三年滑泄之後忌油膩此三者決不可不禁也戴人常曰病久否閉忽得涌泄氣血冲和心腎交媾陽事必舉尤切戒房室元氣新至犯之則病再作恐罪於涌泄

不忌反忌 不忌口得愈

一男子病泄十餘年豈菟阿膠訶子龍骨烏梅枯礬皆用之矣中脘臍下三里歲歲灸之皮肉皴槁神昏足腫泄如泔水日夜無度戴人診其兩手脉沉且微曰生也病人忽曰羊肝生可食乎戴人應聲曰羊肝止泄尤宜服病人悅而食一小盞許可以漿粥送之病人飲粥數口幾半升續又食羊肝生一盞許次日泄幾七分如此月餘而安此皆忌口太過之罪也戴人常曰胃為水穀之海不可虛怯虛怯則百邪皆入矣或思葷茹雖與病

相反亦令少食圖引漿粥此權變之道也若專以淡粥責之則病人不悅而食減久則病增損命世俗誤人矣
不可忌口

戴人常曰臟毒酒毒下血嘔血婦人三十已下血閉六月七月間膿血惡痢疼痛不止婦人初得孕擇食者已上皆不忌口

高技常孤

戴人常曰人言我不接衆工戴人曰余豈不欲接人但

道不同不相為謀醫之善惟素問一經為祖有平生不識其面者有看其文不知其義者此等雖日相親欲何說止不過求一二藥方而已矣大凡藥方前人所以立法病有百變豈可執方設於富貴之家病者數工同治戴人必不能從眾工眾工亦不能從戴人以此常孤惟書生高士推者復來日不離門戴人又曰我之術止可以教書生不能受醫者忽授老書生曰我是書生豈不知書生書生固多許可以易慢戴人問之曰彼未嘗見

予治病故有是言若親見予治病數十人自反思矣凡
謗我者皆望風取信於羣醫之口也孔子曰浸潤之譖
膚受之愬不行焉可謂明也已矣

羣言難正

謗吐

或言人有病不可吐人身骨節皆有涎若吐出骨節間
涎令人偏枯戴人問之曰我之藥止是吐腸胃間久積
或膜盲間宿沫皆是胃膈中溢出者夫下與吐一理也但
病有上下故用藥有逆順耳

謗三法

或言戴人汗下吐三法欲該天下之醫者非也夫古人醫法未備故立此三法後世醫法皆備自有成說豈可廢後世之法而從遠古譬猶上古結繩今日可廢書契而從結繩乎戴人問之曰易之法雖多不離八卦五行刑章雖多不過笞杖徒流岐伯曰知其要者一言而終然則岐伯亦誑人乎大抵舉綱則簡計目則繁

謗峻藥

或言戴人用醫皆峻激乃本草中下品藥也豈可服哉
戴人曰甚矣人之不讀書本草言上藥為君中品為臣
下品為佐使者所以辯其性剛柔也內經言所謂君臣
佐使者非本草中三品之謂也主治之為君次君之謂
臣應臣之為佐使假如大黃能治此病則大黃為君甘
遂能治此病則甘遂為君矣若專以人參黃耆治人之
邪氣此庸工所以常誤人命也李嗣榮言京中閑人云
戴人醫殺二婦遂辭太醫之職而去又有人云昔曾醫

殺頴守私遁而去麻知幾初聞亦疑之乃載見戴人于
滎陽觀其用藥百發百中論議該瞻應變無窮其所治
之疾則不三二十年即十年或五六年應手輒愈羣醫
之領袖無以養生及其歸也謗言滿市皆曰戴人醫殺
倉使耿四而去時倉使以病卒與余未嘗通姓名耿四
病嗽咯血曾問戴人戴人曰公病消困不可峻攻宜以
調養戴人已去後而卒矣麻先生乃肖李嗣榮所言皆
誣也凡余所治之病皆衆壞之證將危且死而治之死

則當怨於戴人又戴人所論按經切理衆誤皆露以是
嫉之又戴人治病多用峻激之藥將愈未愈之間適戴
人去羣醫毀之曰病為戴人攻損急補之遂用相反之
藥如病愈則我藥可久服攻疾之藥可暫用我方攻疾
豈欲常服哉疾去則止藥若果欲養氣五穀五肉五菜
非上藥耶亦安在枯草死木之根核哉

病人負德愈後吝財


南鄉刀鐻工衛氏病風半身無汗已再中矣戴人以三

法療之尋愈恐其求報乃給曰余夜夢一長髯人針余左耳故愈巫者武媪年四十病勞三年羸瘦不足觀諸醫技絕適五六月間求治願奉白金五兩戴人治之五六日而安止答以白金三兩乃曰一道士投我一符焚而吞之乃痊如此等人不可勝計若病再作何以求治至有恥前言而不敢復求治療而殺其軀者此所以世之庸工當正病時以犀珠龍麝丁沉香乳乘其急而巧取之然君子博愛賢愚亦不當効若輩也

同類妒才 羣口誣戴人

有扶救之功如死我則有攻擊之罪明者不可不察也
麻先生常見他醫言戴人能治奇病不能治常病能治
雜病不能治傷寒他日見戴人問以傷寒事超然獨出
仲景言外之意謂余曰公慎勿殫仲景紙上語惑殺世
人余他日再讀仲景方省其旨戴人云人常見傷寒疫
氣動時輒避曰夫傷寒多變須朝夕再視若干人病已
不能給况闔郡之中皆親故人乎其死生常在六七日

之間稍不往視別變矣以此他醫咸謂之以為不能治
傷寒蓋未常窺其涯涘浪為之訾云



儒門事親卷九

欽定四庫全書

子部

儒門事親卷十一

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣呂雲棟

謄錄監生臣洪策

謄錄監生臣唐作梅

欽定四庫全書

儒門事親卷十

金 張從正 撰

難 素 撮 要 究 治

太	太初 也始之氣	太易 也氣見未
---	------------	------------

戊胃	丁心	丙腸小	乙肝	甲膽
----	----	-----	----	----

肺 手未濕土 手太陰	心 手少陰 手君火	包絡 手厥陰 巳風水	小腸 手太陽 辰寒水	大腸 手陽明 卯燥金	三焦 手少陽 寅相火
------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

從 其 氣 則 和

是動則病者
氣之所感也

天之邪感則害
人五臟肝心脾
肺腎實而不滿
可下之而已也

水穀之寒熱感則害
人六腑膽胃三焦膀胱

卷之十

儒門事親

一

識病用藥之圖

太素		太始		極	
也始之質		也始之形			
癸腎	壬膀胱	辛肺	庚大腸	己脾	
脾	腎	肝	膀胱	胃	膽
足丑 太陰	足子 少陰	足亥 厥陰	足戌 太陽	足酉 陽明	足申 少陽
病		則		違	
之所成也		所生病者血		可汗之而已也	
		肌膚從外而入		地之濕氣感則	
		害人皮肉筋脈		不實可吐之而已也	
				膀胱大腸小腸滿而	

天 地 六 位 藏 象 之 圖

此 論 元 無 此 圖 添 之

下絡大腸	肺 象天 上焦	為金主清	金 含德	太虛	屬上二位天
下絡小腸	心 絡包	君火主熱	火	天面	屬
下絡膽經	肝 象人 中焦	風木主溫	木 火含德	風雲 之路	屬中二位天
卷終	膽 次	相火主極熱	火	萬物 之路	屬
下絡腎	脾 象地 下焦	濕土主涼	土 含德	地面	屬下二位地
下絡膀胱	腎 泉 黃	寒水主寒	水	黃泉	屬

外有風寒暑濕屬天之四令無形也

內有饑飽勞逸屬天之四令有形也

一者始因氣動而內有所成者謂積聚癥瘕痞瘤氣瘕

起結核狂瞽癩癘疏曰癥堅也積也瘕氣血也

二者始因氣動而外有所成者謂癰腫瘡瘍疥癬疽

痔瘡瘰癧浮腫目赤燥痊肘腫痛痒之類是也

三者不因氣動而病生於內者謂留飲癖食飢飽勞

損宿食霍亂悲恐喜怒想慕憂結之類是也

四者不因氣動而病生于外者謂瘴氣賊魅虫蛇蠱
毒伏尸鬼擊衝薄墜墮風寒暑濕斫射割刺之
類是也

風木鬱之病

故民病胃脘當心而痛四肢兩脇咽膈不通飲食不
下甚則耳鳴眩轉目不識人善僵仆筋骨強直而不
用卒倒而無所知也

暑火鬱之病

故民病少氣瘡瘍癰腫脇肋胃背首面四肢臃腫
脹瘍痲嘔逆瘕癥骨痛節疼及有動泄注下溫瘧腹
中暴痛血溢流注精液衰少目赤心熱甚則昏悶懊
惱善暴死也

濕土鬱之病

故民病心腹脹腹鳴而為數後甚則心痛脇臑嘔逆
霍亂飲發注下肘腫身重脾熱之生也

燥金鬱之病

故民病欬逆心腹滿引少腹善暴痛不可反側噎乾
面塵色惡金勝而木病也

寒水鬱之病

故民病寒客心痛腰椎痛大關節不利屈伸不便善
厥痞堅腹滿陰乘陽故也

初之氣

自大寒至立春春分厥陰風木之位陽用事而氣微
故曰少陽得甲子元頭常准以大寒交初之氣分以

六周甲子以應六氣下微一月正月二月少陽三陰
三陽亦同

二之氣

春分至小滿少陰君火之位陽氣清明之間又陽明
之位

三之氣

小滿至大暑少陽相火之位陽氣發萬物俱成故亦
云太陽旺其脉洪大而長天氣并萬物人脉盛衰造

物造化亦同

四之氣

大暑至秋分太陰濕土之位天氣吉感夏後陰已用
事故曰太陰旺此三陰三陽與天氣標本陰陽異矣
脉緩大而長燥金旺緊細短濇以萬物乾燥明可見
矣

五之氣

秋分至小雪陽明燥金之位氣衰陰盛故云金氣旺

其脉細而微

終之氣

小雪至大寒太陽寒分之位陰極而盡天氣所收故曰厥陰旺厥者盡也

風木肝酸 達鍼

與膽為表裏東方木也色青外應目主治血芍藥味酸微寒澤瀉鹹平烏梅酸熱

諸風掉眩皆屬於肝木主動治法曰達者吐也其高

者因而越之可刺大敦灸亦同

暑火心苦 發汗

與小腸為表裏南方火色外應舌主血運諸經大黃
苦寒木香苦溫黃連苦涼沒藥苦熱

諸痛痒瘡瘍皆屬於心火治法曰熱者汗之令其疎
散也可刺少衝灸之亦同

濕土脾甘 奪鍼

與胃為表裏中央土也色黃應唇主肌肉應四時密

甘涼甘草甘平

諸濕腫滿皆屬于脾土治法曰奪者瀉也分陰陽利水道可刺隱白灸亦同

燥金肺辛 清鍼

與大腸為表裏西方金也色白外應皮毛鼻亦行氣
乾薑辛熱生薑辛溫薄荷辛涼

諸氣憤鬱皆屬于肺金治法曰清者清膈利小便解
表可刺少商灸亦同

寒水腎鹹 折鹹

與膀胱為表裏北方水也色黑外應耳主骨髓牡蠣
鹹寒水蛭鹹寒

諸寒收引皆屬於腎水治法曰折之謂抑之制其衝
逆可刺涌泉灸亦同

大寒子上初之氣

初之氣為病多發欬嗽風痰風厥涎潮痺塞口喎半
身不遂失音風癩風中婦人胸中留飲兩臍腹微痛

嘔逆惡心旋運驚悸狂陽心風搖擗顛掉初之氣病
宜以芩蒂散吐之在下泄之

春分卯上二之氣

二之氣為病多發風溫風熱經曰風傷於陽濕傷於
陰微頭痛身熱發作風溫之候風傷於衛氣也濕傷
於脾氣也是以風溫為病陰陽俱自浮汗出身重多
眠鼻息語言難出此已上二證不宜下若與芑豈大
毒丸藥熱證併生重者必死二之氣病宜以桂枝麻

黃湯發汗而已

小滿已上三之氣

三之氣為病多發熱皆傳足經者多矣太陽陽明少
陽太陰少陰厥陰陽者發熱惡寒頭項痛腰脊強陽
明身熱目疼鼻乾不得卧少陽者胸脇痛耳聾口苦
寒熱往來而嘔此三陽屬熱太陰者腹滿咽乾手足
自溫自利不渴或腹滿時痛少陰者故口燥舌乾而
渴厥陰者腹滿囊縮喘熱悶亂四肢厥冷爪甲青色

三之氣病宜以清涼上溫下養不宜用芫苢丸下

大暑未上四之氣

四之氣為病多發暑氣頭痛身熱發渴不宜作熱病
治宜以白虎湯得此病不傳染次發脾泄胃泄大腸
泄小腸泄大瘕泄霍亂吐瀉下痢及赤白相雜水穀
不分消腸鳴切痛面浮足腫目黃口乾脹滿氣痞手
足無力小兒亦如此四之氣病宜滲泄五苓散之類
也

秋分酉上五之氣

五之氣為病多發喘息嘔逆欬嗽及婦人寒熱往來
瘡癰痺痔消渴中滿小兒斑癰瘡疱五之氣病宜以
大小柴胡湯宜解治表裏之類

小雪亥上終之氣

終之氣為病多發風痰風寒濕痺四肢秋收多冬水
復旺水濕相搏肺氣又衰冬寒甚故發則收則痿厥
弱無以運用水液澄清冷大寒之疾積滯癥塊寒疝

血癥凡氣之疾終之氣病宜破積發汗之類

肝之經足厥陰風乙木

是動則病腰痛不可以俛仰丈夫癩疔婦人少腹腫甚則嗑乾面塵脫色是肝所生病者胸滿嘔逆飧泄狐疔遺溺閉癢為此諸病

膽之經足少陽風甲木

是動則病口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微有塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨所生病

者頭痛頷痛目內眥痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀俠
癭汗出振寒瘧胸脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸
節皆痛小指次指不用為此諸病

心之經手少陰暑丁火

是動則病嗑乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主心所
生病者目黃脇痛臑臂內後廉痛厥掌中熱痛為此
諸病

小腸經手太陽暑丙火

是動則病噎痛頷腫不可以顧肩似拔膈似折是主
液所生病者耳聾目黃頰腫頸頷肩膈肘臂外後廉
痛為此諸病

脾之經足太陰濕已土

是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與
氣則快然如衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛
體不能動搖食不下煩心心下急痛溇瘕泄水閉黃
疸不能卧強立股膝內腫厥足大指不用為此諸病

胃之經足陽明濕戾土

是動則病洒洒振寒善呻數欠顏黑至則惡人與火
聞木聲則惕然而驚心欲動獨閉戶塞牖而處甚則
欲上高而歌棄衣而走責響腹脹是為肝厥是主血
所生病者狂瘧溫淫汗出鼽衄口喎唇胗頸腫喉痺
大腹水腫膝臏腫痛循膺乳氣衝股伏兔肝外廉足
跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘于
胃則消穀善飢溺色黃氣不足則身以前皆寒慄胃

中寒則脹滿為此諸病

心包絡手厥陰為母血

是動則病手心熱臂肘攣急腋腫甚則胸脇支滿心中憺憺大動面赤目黃喜笑不休是主脉所生病者煩心心痛掌中熱為此諸病

三焦經手少陽為父氣

是動則病耳聾渾渾痺痺噤腫喉痺是主氣所生病者汗出目銳皆痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指

不用為此諸病

大腸經手陽明燥庚金

是動則病齒痛頸腫是主津液所生病者目黃口乾
衄衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣有餘則當
脉所過者熱腫虛則寒慄不復為此諸病

肺之經手太陰燥辛金

是動則病肺脹滿膨脗而喘欬缺盆中痛甚則交兩
手而督此為臂厥是主肺所生病者欬上氣喘渴煩

心胸滿臍臂內前廉痛厥掌中熱氣盛有餘則肩背
痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少
氣不足以息溺色變為此諸病

腎之經足少陰寒癸水

是動則病飢不欲食面如漆柴紋唾則有血啾啾坐
而欲起目眈眈如無所見心如懸若飢狀氣不足則
善恐心惕惕如人將捕之是為骨厥是主腎所生病
者口熱舌乾噤腫上氣噤乾及痛煩心心痛黃疸腸

避脊股內後廉痛痿厥嗜卧足下熱而痛為此諸病
膀胱經足太陽寒士水

是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折髀不
可以曲脰如結踠如裂是為蹠厥是主筋所生病者
痔瘡狂癩疾頭顛項痛目黃淚出鼻衄項背腰尻脰
踠脚皆痛小指不用為此諸病

風治法風淫于內治以辛涼佐以甘辛以甘緩之以辛
散之

防風通聖散

天麻散

防風湯

祛風湯

小續命湯

消風散

排風湯

暑治法熱淫于內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之

白虎湯

桂苓湯

玉壺丸

碧玉散

玉露散

石膏湯

濕治法濕淫于內治以苦熱佐以鹹淡以苦燥之以淡

泄之

白朮木香散 桂苓白朮丸 五苓散

葶藶木香散 益元散 神助散

火治法火淫于內治以鹹寒佐以甘辛以酸收之以苦發之

涼膈散 解毒丸 神功丸

八正散 調胃散 大小承氣湯

燥治法燥淫于內治以苦溫佐以甘辛以辛潤之以苦

下之

神功丸

麻仁丸

脾約丸

潤體丸

潤腸丸

四生丸

葶藶散

寒治法寒淫于內治以甘熱佐以苦辛以辛散之以苦

堅之

薑附湯

四逆湯

二薑湯

木附湯

大戊己丸

附子理中湯

六門病證藥方

風門獨治於內者

防風通聖散

防風天麻丸

防風湯

小續命湯

消風散

祛風丸

承氣湯

陷胸湯

神芎丸

大黃丸

備急丹

暑門獨治於外者

白虎湯

桂苓甘露散

化痰玉壺丸

益元散

玉露散

石膏散

拔毒散

水澄膏

魚膽丸

金絲膏

生肌散

濕門兼治於內者

五苓散

葶藶木香散

白朮木香散

益元散

大橘皮湯

桂苓白朮丸

神助散

大柴胡湯

小柴胡湯

柴胡飲子

防風通聖散

防風當歸飲子

火門兼治於外者

涼膈散

黃連解毒湯

瀉心湯

神芎丸

八正散

調胃散

調胃承氣湯

桂苓湯

麻黃湯

小建中湯

升麻湯

五積散

燥門先治於內後治於外者

神芎丸

脾約丸

麻仁丸

潤體丸

四生丸

謂寒藥攻其裏大黃兼牽牛之類

謂熱藥攻其表桂枝麻黃升麻之類

薑附湯

四逆湯

二薑湯

朮附湯

寒門先治於外後治於內者

大已寒丸

理中丸

謂熱藥攻其表

謂寒藥攻其裏

內經濕變五泄

六氣屬天無形風暑濕火燥寒

五形濕屬戊己濕入肺經為實

六味屬地有質酸苦甘辛鹹淡

五臟濕屬脾胃濕入大腸為虛

胃泄風濕

夫胃泄者飲食不化完穀出色黃風乘胃也宜化劑之類

脾泄暑濕

夫脾泄者腹脹滿注實則生嘔逆三證宜和劑淡劑甘劑清劑之類

大腸泄燥濕

夫大腸泄者腸鳴切痛先宜寒劑奪之次甘劑分其陰陽也

小腸泄熱濕

夫小腸泄者澁而便膿血少腹痛宜寒劑奪之淡劑甘劑分之

大瘕泄寒濕

夫裏急後重數至圜而不能便先宜清劑寒劑奪之後以淡劑甘劑分之或莖中痛亦同

金櫃十全之法

殮泄春傷於風夏必殮泄暮食不化亦成殮泄風而
殮泄者先宜發劑次宜淡劑甘劑分劑之類

洞泄春傷於風邪氣留連乃為洞泄瀉下褐色治法
同上又宜灸分水穴濕氣在下又宜以苦劑越之

洞泄寒中 洞泄寒中俗呼曰休息痢洞泄屬甲乙

風木可灸氣海水分三里慎勿服峻熱之藥小便
澁則生足腫腹脹滿者死於庚辛之日如屍臭者

不治

霍亂吐瀉水穀不化陰陽錯亂可服淡劑調以水
水令頓服之則愈

注下火氣太過宜涼劑又宜淡劑調水水令頓服
之則愈此為暴下不止也

腫蠱三焦閉溢水道不行水滿皮膚身體否腫宜
越劑發劑奪劑

臌脹濁氣在上不散可服木香檳榔丸青皮陳皮

屬大腸為濁氣逆肺金為清氣逆氣化則愈矣

腸鳴 燥濕相搏為腸鳴中有濕亦為腸鳴火濕相
攻亦為腸鳴治法同上治之大効

支滿鶩溏 上滿而後泄下泄而後復上滿治法同
上久則反寒治法同寒中如鶩溏而腸寒者亦斯
義風濕亦有支滿者

腸澼 大小便膿血治法同上又宜不二丸地榆散
駐車丸及車前子等藥次宜淡劑甘劑分劑之類

臟毒 下血治法同上又宜苦劑奪劑以苦燥之如
酒毒下血同

大小便血 大小便治法同上血溫身熱者死火之
成數七日而死如屍臭者不治

脫肛 大腸熱甚也用酸漿水煎三五沸稍熱漂洗
三五度次以苦劑堅之則愈

廣腸痛 治法同上又大黃牽牛丸散奪之法燥瀉
亦同痔漏廣腸痛腸風下血皆同臟毒治法

乳痔腸風 肛門左右有核內經曰因而飽食筋脉
橫解腸澼為痔屬大腸經可服枳殼之屬大瘕生
腸風乳痔相連

金櫃十全五泄法後論

天之氣一也一之用為風火燥濕寒暑故濕之氣一之
一也相乘而為五變其化在天為雨在地為泥在人為
脾甚則為泄故風而濕其泄也胃暑而濕其泄也脾燥
而濕其泄也大腸熱而濕其泄也小腸寒而濕其泄也

大瘕若胃不巳變而為殮泄殮泄不巳變而為洞泄洞泄不巳變而為洞泄寒中此風乘濕之變也若脾泄不巳變而為霍亂霍亂不巳變而為注下注下不巳變而為腫蠱此暑乘濕之變也若大腸泄不巳變而為臍脹臍脹不巳變而為腸鳴腸鳴不巳變而為支滿鶩溏此燥乘濕之變也若小腸泄不巳變而為腸澼腸澼不巳變而為臟毒臟毒不巳變而為前後便血此熱乘濕之變也若大瘕泄不巳變而為脫肛脫肛不巳變而為廣

腸痛廣腸痛不已變而為乳疔腸風此寒乘濕之變也
凡此二十五變若無濕則終不成疾况脾胃二土共管
中州脾好飲脾亦惡濕此泄之所由生也凡下痢之脉
微且小者生浮大者死水腫則反是浮大者生沉細者
死夫病在裏脉沉在表脉浮裏當下之表當汗之下痢
而脉浮滑水腫者脉沉細表裏俱受病故不治也凡臟
血便血兩手脉俱弦者死絕俱滑大者生血溫身熱者
死王太僕則曰若下血而身熱血溫是血去而外逸也

血屬火故也七日而死者火之成數也夫殮泄得之於風亦汗可愈或伏驚怖則膽木受邪暴下綠水蓋謂戊已見伐於甲木也嬰兒泄綠水素問有嬰兒風理亦如之洞泄者殮泄之甚但殮泄近於洞泄洞泄久則寒中溫之可也治法曰和之則可也汗之則不可蓋在腑則易治入臟則難攻洞泄寒中自臍而入臟宜和解而勿爭水腫之作者未遽而然也由濕遍於大腸小溲自濇水濕既瀦腫滿日倍面黃腹大肢體如泥濕氣周身難

專一法越其高而奪其下發其表而滲其中酸收而辛散淡滲而苦堅用攻劑以救其甚緩劑以平其餘如是則孤精得氣獨魄反陽亦可保形陳莖去而淨府潔矣彼豈菀烏梅罌粟囊勿驟用也設病形一變必致大悞或通而塞或塞而通塞塞通通豈限一法世俗止知塞劑之能塞而不知通劑之能塞者拘於方也凡治濕皆以利小溲為主諸泄不已宜灸水分穴謂水穀之所別也臍之上一寸半灸五七壯腹鳴如雷水道行之候也

凡濕勿鍼內經雖云繆刺其處莫若以張長沙治傷寒
法治之蓋泄者亦四時傷寒之一也仲景曰上涌而下
泄表汗而裏攻半在表半在裏則宜和解之表裏俱見
隨證滲泄此雖以治傷寒其於治濕也同仍察脉以視
深淺問年壯以視虛實所投必如其意矣頃商水縣白
堤酒監單昭信病殮泄逾年不愈此邑劉繼先命予藥
之為桂枝麻黃湯數兩一劑而愈因作五泄圖摭難素
本意書錄于上刊而行之誠有望于後之君子戴人張

子和述已上之圖校改為篇法

儒門事親卷十